READ THE LABEL BEFORE USING

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION



PRO-PERM INSECT KILLER INSECTICIDE PRO-PERM

DOMESTIC/DOMESTIQUE

CONTINUOUS COCKROACH KILLING ACTION FOR 60 DAYS. LONG-LASTING ACTIVITY AGAINST BROWN DOG TICKS. FLEAS AND SPIDERS.

To control ants, brown dog ticks, carpet beetles, clothes moths, cockroaches, crickets, firebrats, fleas, house flies, red flour beetles, rice weevils, silverfish, sowbugs, spiders, and aphids and whiteflies on indoor plants. also kills bedbugs and earwigs.

TUE LES BLATTES AVEC UNE ACTION CONTINUE DE 60 JOURS. EFFET DE LONGUE DURÉE CONTRE LES PUCES. LES TIQUES BRUNES DES CHIENS. ET LES ARAIGNÉES.

Pour contrôler : les fourmis, les tiques brunes des chiens, les anthrènes des tapis, les mites (teignes), les coquerelles, les criquets, les thermobies, les puces, les mouches domestiques, les triboliums rouge de la farine, les charcons du riz. les poissons d'argents, les cloportes, les araignées et les pucerons et les mouches blanches retrouvés sur les plantes intérieures. Tue aussi les punaises des lits et les perce-oreilles.

REG. NO. 35503 P.C.P. ACT/No. D'HOMOLOGATION 35503 LOI P.A.

WATER-BASED SOLUTION • INDOOR & OUTDOOR USE • FAST ACTION • RESIDUAL (24/7) À BASE D'EAU SOLUTION • POUR UTILISATION À L'INTÉRIEURE ET À L'EXTÉRIEURE • ACTION RAPIDE • RÉSIDUEL (24/7) CONTAINS D-LIMONENE & LEMONGRASS FRAGRANCE/CONTIENT LES ARÔMES DE LE D-LIMONENE ET DE LE LEMONGRASS

ACTIVE INGREDIENTS/PRINCIPE ACTIF:

Contains sodium benzoate at 0.1% as a preservative/Contient du sodium benzoate à raison de 0.1 % à titre d'agent de conservation

NON FLAMMABLE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NUN INFLAMMABLE
NET CONTENTS

3.78 L CONTENU NET GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DIRECTIONS: For spot or crack and crevice applications only. Do not use as a space spray or broadcast application. Apply with attached trigger sprayer. Adjust nozzle to suitable spray pattern. Apply directly to pests if possible. If pests continue to be a oroblem, repeat adouctain or an excessarv.

FOR INDOOR USES:

ANTS, COCKROACHES, CRICKETS, EARWIGS, FIREBRATS, SILVERFISH, SOWBUGS, SPIDERS, RED FLOUR BEETLES, ANDRICE WEEVILS: Direct the spray into hiding places, cracks, crevices, behind shelves and drawers. For ants, cockroaches, silverfish, sowbugs and spiders, also spray along door sills, baseboards and openings around sinks, drains and piges, behind stoyes and refrigerators, around window frames, in localized areas of attics and basements and around interior foundations. For silverfish, also spray bookcases. For ants, also spray trails, nest and points of entry. CARPET BEETLES: Spray edges of carpeting and under carpeting and rugs for approximately 10 seconds duration. Make localized application to floor and baseboards. Spray directly into cracks, crevices and infested areas of shelving. FLEAS (ADULT AND LARVAE) AND BROWN DOG TICKS (ADULT AND NYMPHS): Thoroughly spray infested areas, pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, moldings, window and doorframes. Fresh bedding should be placed in animal quarters following treatment. Allow to dry thoroughly before allowing pets to contact treatment areas. BED BUGS: Apply spray directly into cracks and crevices where these pests are found or may hide along and behind baseboards, moldings and floors underneath objects such as the bed and nightstand. Apply directly to insect if possible. CLOTHES MOTHS: Remove any infested articles from storage, brush thoroughly and air for several hours in sunlight, if possible. Apply spray to empty chests, closets, bureaus and other storages, directing the spray into cracks, joints and crevices. After airing, infested articles may be treated lightly, keeping nozzle at least 90 centimeters (three feet) from fabric to avoid staining, Allow articles to dry before handling and launder cloths before wearing, HOUSE FLIES; Spot treatment only, Spray inside around windows and doors where insects enter or rest.

FOR OUTDOOR USES

ANTS, GRICKETS, FLEAS, SPIDERS, SOWBIGS AND BROWN DOE TICKS: Spray outside surfaces of screens, doors, window trames, froundations, eave troughs, under eaves, patios, light fixtures and other places where insects may congregate on the structure or enter the structure. HOUSE FLES: Spot treatment only. Spray outside around windows and doors where insects enter or rest. Vinyl and Aluminum Siding. The application of this product to viryl and aluminum siding (particularly lightly colored, aped, weathered or otherwise damageal) may result in staining, bleaching or discoloration. Factors such as extreme heat and direct sunlight can promote damage. Before applying to vinyl or aluminum siding, breat a small area and evaluate 30 minutes later to allow any potential staining to occur. Regardless of the test results, do not apply to vinyl or aluminum siding while exposed to direct sulinibir or during the heat of the day.

FOR INDOOR PLANTS:

APHIDS AND WHITEFLIES: Spray surfaces of upper and lower leaves of plants until damp, but not to the point of running off. Safe for use on most plants. Before treating delicate plants, spray only 1 2 leaves and wait 2 days to be sure the plant leaves are not dramaned!

LIMITATIONS: DO NOT USE on humans or animals. The application of this product to vinyl and aluminum siding (particularly lightly colored, aged, weathered or otherwise damaged) may result in staining, bleaching or discoloration. Factors such as extreme heat and direct sunlight can promote damage. Before applying, treat a small area of the siding and evaluate 30 minutes later to allow any potential staining to occur. Regardless of the test results, do not apply to vinyl or aluminum siding while exposed to direct sunlight or during the heat of the day. Do not apply to tapestine, wall paper or similar materials that may be stained. For all other surfaces, test a small inconspicuous area of the surface to be treated for color relatives & Satinian Gente for full application.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT USE AS A SPACE SPRAY. Do not use in areas where food is handled, prepared or stored. Wash thoroughly after handling and before smuface in greating. Remove pets and brids and cover fish aquadriums before surface applications. After use and at least one (1) hour drying time, was all surfaces that may contact food. Do not use on humans or animals. Do not allow people or pets to contact treated areas until surfaces are dry. This product is extremely toxic to fish and aquatic invertibrates. Do not apply directly to lakes, invers, streams, ponds, tidal marshes and estuaries. Do not contaminate the above mentioned aquatic areas through sory offit; cleaning of equipment of disposal of waste.

FIRST AID. If in eyes hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15.20 minutes. Remove contact lenses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center doubt for treatment advice. By vailouved: Call a poison control centre or doubt or immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doubt. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If minated. More person to fresh air. If person is not breathing, call 91 or an anabulance, then give artificial respiration, preferably by mouth to mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Rejections from Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

DISPOSAL: Do not reuse empty container. Wrap empty container and discard in household garbage.

100 ML TO 4 L TRIGGER SPRAYER

APPLICATOR DIRECTIONS: Adjust spray nozzle to desired spray pattern and squeeze trigger to operate.

STORAGE: Rotate nozzle to closed position. Close nozzle on trigger spray.



Made in Canada by/Fabriqué au Canada par : UR-CAN INC. • P.O. 20069 BRANT HILLS RUBI INGTON ONTARIO I 7P 0A4 • 1-888-484-3213 QR CODE PLACEHOLDER

> recommended size: 1'x1"

MODE D'EMPLOI: Pour application locale ou dans les craques ou les fissures seulement. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance ou en application généralisée à l'intérieur. Appliquer avec le puivérisation d'embient es qui gible pour obterir la configuration de puivérisation désirée. Appliquer feccientent sur les gestes s, possible. Si les pestes persistent régiere l'application qui besin.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR :

LES FOURMIS, LES COQUERELLES, LES CRIQUETS, LES PERCE OREILLES, LES THERMOBIES, LES POISSONS D'ARGENT, LES CLOPORTES, LES ARAIGNÉES, LES TRIBOLIUMS ROUGE DE LA FARINE, ET LES CHARÇONS DU RIZ : Diriger le jet dans les craques, les fissures, derrière les étagères et les commodes, dans tous les endroits où les insectes pourraient se cacher. Pour les fourmis, les coguerelles, les poissons d'argent, les cloportes et les araignées, pulvériser du produit aux seuils des portes, le long des plinthes, sur les ouvertures autour des éviers, des drains et des tuyaux, derrière le fourneau, le réfrigérateur, autour du cadre des fenêtres, dans des zones localisées des greniers et des sous sols et autour des bases de fondations internes. Pour les poissons d'argent, appliquer aussi le produit sur les bibliothèques. Pour les fourmis, appliquer aussi le produit sur les points d'entrés, les nids et les sentiers de fourmis. LES ANTRÈNES DES TAPIS: Pulvériser du produit sur les bords des tapis et sous les tapis pendant environ 10 secondes. Faire des applications localisées du produit sur le plancher et les plinthes. Pulvériser directement dans les craques. les fissures et toutes zones infestées sur les étagères. LES PUCES (ADULTES ET LARVES) ET LES TIQUES BRUNES DES CHIENS (ADULTES ET NYMPHES): Pulvériser généreusement les zones infestées, les lits des animaux, les espaces de repos, les craques et fissures à proximités, le long et derrière les plinthes, les moulures et les cadres de fenêtres et de portes. De la nouvelle literie devrait être placée dans les espaces de repos des animaux après le traitement. Permettre au produit de sécher complètement avant de permettre aux animaux d'entrer en contact avec les zones traitées. PUNAISES DES LITS : Pulvériser directement dans les craques et les fissures où les pestes se trouvent ou pourraient se cacher; le long et derrière les plinthes, les moulures et le plancher, sous les objets comme les lits et les tables de nuits. Pulvériser directement sur l'insecte si possible. LES MITES (TEIGNES): Enlever tous articles infestés de son lieu d'entreposage, les brosser méthodiquement et les airer au soleil pendant plusieurs heures, si possible. Appliquer le produit dans tous les espaces de rangement vides en dirigeant le jet dans les craques, les fissures et les joints. Suite à l'aération des articles, ils peuvent être légèrement traités avec le produit en gardant le bec du contenant à au moins 90 centimètre (3 pieds) du tissu pour éviter la formation de tâches. Attendre que les articles sèchent avant de les manipuler et bien les laver avant de les porter. LES MOUCHES DOMESTIQUES : Faire des applications localiser seulement. Pulvériser, à l'intérieur de la maison, autour des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent.

POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEURE :

LES FOURMIN, LES CRIQUETS, LES PUCES, LES ARAIGNÉES, LES CLOPORTE ET LES TIQUES BRUNES DES CHIENS: Appliquer le produit sur les surfaces extérieures des écrans moustiquières, des portes, des cadres de fineitres, des fondations, dans et sous les goutifières, les padios, les bimières et tous autres enforts dus les insectes pourraisten serassemble en les chructures ou prévièrer. LES MOUGHES DOMESTIQUES. Fair des applications localiser seulement. Pulvériser, à l'extérieure de la maison, autour des fenêtres et des portes où les insectes entrent ou se reposent. Bardage en vinyle ou en aluminium: L'utilisation de se produit sur du vinyle ou de l'aluminium (en particulier s'il est de couleur pâle, à prit de l'âge, a dié exposé honglemps aux intemplies ous est endomagé de toutes autres façon) peut cusaire set acheds, des blanchissements ou de la décoration. Certains facteurs, comme la chaleur extrême et l'exposition directe au soleil peuvent promouvoir la dégradation et les dommages. Avant de pulvériser, traiter une petite surface et attende 30 minutes avant d'évaluer s'il y a potentiel de tacher. Peu import le ser évalutats du test, ne pas appliquer sur du vinyle oud le l'aluminium lorsque la surface et directement exposés au soleil ou lors de La chaleur du lour.

POUR LES PLANTES INTÉRIEURES :

LES PUCERONS ET LES MOUCHES BLANCHES: Pulvériser le produit sur les feuilles du haut et du bas des plantes jusqu'à ce qu'elles soient humide, mais pas jusqu'à up oint où il y a des écoulements de produit à leur surface. Peut être utilisé sans dangers sur la majorité des plantes. Avant de traiter des plantes (élicates, appliquer du produit sur une ou deux feuillés seulement et attendre 48 heures pour s'assurer que les feuilles ne seront pas enfontmanées en la norbuit

LIMITATIONS: NE PAS UTILISES aur les humains ou les animaux. L'utilisation de se produit sur du vinyle que de l'aluminium en particulier s'il est de couleur pile à prit de l'âge, a été eugosé longtems aux intérmpéries ou est enformagé de toutes autres fapon peur cause des bathes, les blanchissements ou de la décoloration. Certains factures, comme le chaleur entrême et l'exposition directe au soleil peuvent promouvoir la dégradation et les dommages. Avant de pulveirser, traiter une petite surface et attendre 30 minutes avant d'évaluer s'il y a potentiel de tacher. Peu importe les résultats du test, ne pass appliquer sur du vinyle ou de l'aluminium brisque la surface est directement exposée au soleil ou lors de la chaleur du jour. Ne pas appliquer sur des tapisseries, du papier peint ou du matériel similaire qui peut être cotore. Pour toutes autres surfaces à traiter, effectuer un test ance le produit sur une petite surface pour vérifier s'il y a ceffet sur la couleur avant d'appliquer le produit en grande quarité.

PRÉCAUTIONS: CARDER HORS DE LA PRÔTÉE DES ENFANTS. Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambience. Ne pas utiliser dans les endroits où la nourriture est manipulée, préparée ou entreposée. Bien se laver agrès avoir manipulé le produit et avant de fumer ou de manger. Avant de traiter les arimaux familiers et les oiseaux, et couvrir les aquarimms. Après l'utilisation et après au moins une heure de séchage, laver toutes les surfaces qui pourraient rentrer en contact avec la nourriture. Ne pas utiliser sur les bumains ou les animaux. Ne pas laisser les personnes in les animaux familiers entrer en contact avec les undress traitées tend que celles ci ne seront pas sebes. Ce produit es tertiémement toèque pour les poisons et les inverteirées aquatiques. Ne pas pulvériser directement dans les lacs, les rivières, les nuisseaux, les étangs, les marais intertidaux ou les estuaires. Ne pas contamimer les zones susmentionnées par l'application indirecte de ce produit par brumisation, en nettoyant l'équipement que el filimant les déchets.

PREMIERS SOIMS: En cas de contact avec les yeux. Carder les paughières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échent retirer les lentifics contraines de mois réport des motiers et communes de l'experiment des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre antil poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre antil poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Pien sais d'air voir les conseils sur le traitement. En cas d'ingestion : Appeler un centre antil poison ou le médecin. Faire boirs un verer d'eau al pretites oppréses à la personne empositemée est capacité d'avaiter. Ner len administrer par la bouché a une personne inconsciente. En ca d'inhabition : Déplacer la personne vers une source d'air fairs. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiret pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiret pas, appeler le 911 ou une médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aint médical.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas ré utiliser les contenant vides. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE DE 100 ML À 4 L

MODE D'EMPLOI POUR LE VAPORISATEUR : Régler la buse au type de polvérisation souhaité et activer la gâchette pour mettre en marche. ENTREPOSAGE : Tourner la buse en position fermée. Fermer la buse du pulvérisateur.